

Hygieneschädling

Schabe, Deutsche = Hausschabe (**Blattella germanica**)



Biologie:

- Ca. 13 mm groß
- gelbbraun mit 2 dunkelbraunen Längsstreifen auf dem Halsschild
- Beide Geschlechter geflügelt, fliegen aber nicht.
- Eipaket mit 20-40 Eiern wird vom Weibchen ca. 4-5 Wochen herumgetragen und dann wahllos abgelegt
- Kurz darauf schlüpfen die dunkelbraun gefärbten Junglarven
- Gesamte Entwicklungsdauer 2-3 Monate
- Liebt wie alle Schabenarten dunkle, feuchte Verstecke und wird daher häufig lange Zeit nicht bemerkt
- Geht nur nachts auf Nahrungssuche
- können längere Zeit hungern
- Die Eipakete sind wegen ihrer Chitin-Hülle sehr widerstandsfähig, auch gegenüber Bekämpfungsmitteln

Schaden:

- sind Allesfresser und gehen auch an organisches Material aller Art, wie z.B. Gewebe, Leder und Papier
- Feuchte, weiche, auch faulende Lebensmittel und Stoffe werden am liebsten aufgenommen
- Schaden durch Verunreinigung und Verbreitung von Fäulnisregnern und Krankheitskeimen, wie z.B. Milzbrand, Salmonellen, Tuberkulose;
- auch Zwischenwirt von Fadenwürmern. Mitverantwortlich für den Hospitalismus in Krankenhäusern.

Bei Fragen zur Bekämpfung wenden Sie sich vertrauensvoll an das Ingenieurbüro Stöckler